

Aus der Universitätsfrauenklinik, Bonn.

Direktor: Prof. Dr. Siebke.

Verlauf und Heilungsaussichten
bei Blasenmole und Chorionepitheliom.
(An Hand der Fälle in der Univ.-Frauenklinik Bonn
von 1912—1934)

INAUGURAL-DISSERTATION

zur

Erlangung der Doktorwürde

der Hohen Medizinischen Fakultät

der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn.

Vorgelegt am 25. Januar 1937.

von

Willy Delord

aus Jülich.

BONN 1938

Anton Brand, Bonn.

Gedruckt
mit Genehmigung der medizinischen Fakultät
der Universität Bonn.

Referent: Doz, Dr. R u p p
Korreferent: Prof. Dr. S i e b k e.



Meinen lieben Eltern gewidmet!

1870
1871
1872

Inhaltsverzeichnis.

<i>A. Blasenmole.</i>	
Allgemeines	5
Symptome	7
Diagnose	8
Therapie	12
<i>B. Über destruierende Blasenmole (Fall H. R. Schmidt)</i> . .	15
<i>C. Chorionepitheliom.</i>	
Allgemeines	16
Metastasen	18
A.Z.R.	19
Chorionepitheliom auf teratoider Basis	19
Klinik	20
<i>D. Therapieerfolg der hiesigen Klinik</i>	28
1. bei Blasenmole	28
2. bei Chorionepitheliom	29
<i>Zusammenfassung</i>	29
<i>Literaturangabe</i>	31

A) Blasenmole.

Allgemeines.

Die Blasenmole (*mola vesicularis* oder *cystica*, von der alten parasitären Anschauung her *hydatidosa*, nach der neueren Auffassung *hydatiformis* genannt) ist eine Erkrankung der Plazenta, insbesondere ihrer Zotten.

Früher als tierischer Parasit gedeutet, galt sie bei *Velpeau*, *J. Müller*, *Meckel* u. a. als Zottenödem. *Heinrich Müller* hatte aber schon angenommen, daß eine primäre Veränderung der epithelialen Teile des befruchteten Eies vorläge. *Virchow* deutete sie als myxomatöse Degeneration der Chorionzotten, eine Ansicht, die aber zur Zeit nicht mehr haltbar erscheint.

Nach *Marchand* ist die Blasenmole das Resultat einer regellosen Wucherung der Zottenepithelien mit hydropischer Entartung des Bindegewebes und schließlich Nekrose. Während die oberflächlichen Schichten des Stromas der Zotte erhalten bleiben, verflüssigt sich das Innere. Hierdurch entstehen Blasen von ungeheurer Anzahl. Der Wucherungsprozeß betrifft im wesentlichen das Epithel der Zotte, sowohl das Synzytium als die Langhanssche Zellschicht.

Den neuesten Stand über die Auffassung der Blasenmole kann man dahin zusammenfassen, daß die blasige Auftreibung der Zotten heute ganz allgemein als regressive Veränderung des Stromas angesehen wird, während es noch unentschieden bleibt, ob ein irgend nennenswertes proliferatives Stadium im Bindegewebe besteht, das nur ganz vereinzelt beobachtet wurde. Ein proliferatives Stadium im Epithel wird dagegen sehr häufig gefunden, und wenn es auch meist ebenfalls der Rückbildung bald anheimfällt, so kann es doch sehr lange bestehen und sogar zum malignen Chorionepitheliom führen.

Die Blasenmole befällt Frauen jeden Alters, ohne Bevorzugung bestimmter Altersklassen, wie *Essen-Möller* entgegen älteren Ansichten berechnet hat.

Es ist *L. Zeiß* auffällig, daß von 7 Blasenmolen 4 im jugendlichen Alter von 16—21 Jahren stehen, 2 dagegen 40 bzw. 50 Jahre alt sind. Nur ein Fall steht mit 35 Jahren in der Mitte.

Von 1912—1934 sind an der hiesigen Universitätsfrauenklinik 28 Fälle von Blasenmolen beobachtet worden. Davon entfielen:

- 4 Fälle auf Np.
- 20 Fälle auf Mp. (darunter 10 Pat. m. Geb. u. Abort)
- 2 Fälle auf Aborte allein.
- 2 Fälle auf Blasenmolen.

Wie sind nun hier die 28 Fälle auf das einzelne Alter verteilt?

Alter	Fälle
20 Jahre . . .	1
21 „ . . .	1
22 „ . . .	2
27 „ . . .	3
28 „ . . .	1
29 „ . . .	1
30 „ . . .	5
32 „ . . .	1
36 „ . . .	2
40 „ . . .	1
45 „ . . .	2
47 „ . . .	2
48 „ . . .	1
49 „ . . .	2
52 „ . . .	1
54 „ . . .	1

Fassen wir nun die einzelnen Alter in Altersklassen zusammen, so sehen wir, daß das Maximum im 3. Jahrzehnt liegt. Im 4. Jahrzehnt sinkt die Zahl erheblich. Dann kommt im 5. Jahrzehnt ein nochmaliger Anstieg, der ein Drittel aller Blasenmolen ausmacht.

v. 16—20 Jahren	1 Fall
v. 21—30 Jahren	14 Fälle
v. 31—40 Jahren	4 Fälle
v. 41 und darüber	9 Fälle.

Entgegen den Ansichten *Essen-Möllers*, bin ich geneigt, doch eine Bevorzugung einer Altersklasse anzunehmen, zumal dies ja auch aus beiden Tabellen klar hervorgeht.

Diese Beobachtungen entsprechen auch denen, die *Egon Winter* (Gießen) an der Universitätsfrauenklinik zu Gießen gemacht hat. Er fand bei 20 Fällen von Blasenmole allein 13 bei Frauen bis zu 30 Jahren.

Die Statistik von *L. Zeiß*, wenn sie überhaupt bei der geringen Anzahl von Fällen als solche gewertet werden kann, will meines Erachtens weniger die Bevorzugung des jugendlichen Alters, als vielmehr darauf hinweisen, daß in diesem Alter unbedingt mit Blasenmole gerechnet werden muß.

Was die Wiederholung der Blasenmolengeburt angeht, so ergeben die bis heute angestellten Untersuchungen bei Jugendlichen für den Zeitraum von 1—12 Jahren keine Wiederholung. Mehrfache Wiederholung bei derselben Frau ist überhaupt nicht häufig, meist nur 2—3mal; aber auch Fälle von sechsmaliger (*Hermont*), elfmali-

ger (*Maier*) und fogar achtzehnmaliger (*Essen-Möller*) Wiederholung sind beobachtet worden. *Bazan* berichtet über einen Fall, wo wiederholt Blasenmole zwischen normalen Geburten vorkam. Nicht selten folgen auf Blasenmolen später normale Geburten (*Sunde*).

Ich habe bei zwei Patientinnen eine dreimalige Wiederholung festgestellt können.

Die Blasenmole soll nach *Kehrer* im 4. und 5. Monat am häufigsten ausgestoßen werden, doch sind Fälle von 2. und 3. Monat ebenso wie 6. bis 9. Monat nicht selten.

Die folgende Tabelle soll nun die zeitliche Ausstoßung der Blasenmole bei unseren Patientinnen zeigen.

Monat	Ausstoßung
1.	0
2.	1
3.	7
4.	13
5.	3
6.	2
7.	1
8.	0
9.	0

Symptome: Die Symptome der Blasenmole bestehen in ungewöhnlich raschem Anwachsen des Uterus, wässerigem und blutig-wässerigem Ausfluß, dann in zeitweisen profusen Blutungen, bis endlich unter starkem, fogar tödlichem Blutabgang der Abort meist im 3. bis 5. Monat, wie es ja auch obige Tabelle veranschaulicht, eintritt.

Ad demonstrationem sollen 3 Fälle folgen:

I. Fall. 36jährige Patientin, die 7 Entbindungen und 3 Aborte durchgemacht hat. Mit 17 Jahren menstruiert, 28 : 3—4, geringer Blutverlust. Letzte Periode war Ende Januar. Mitte März begann Patientin stark zu bluten. Sie bemerkte hierbei den Abgang von dicken Klumpen. Die Blutung dauerte etwa 14 Tage. Darauf hatte sie vier Wochen Ruhe. In den Zwischenräumen stets stark faul riechenden Ausfluß. Die jetzige Blutung dagegen besteht aus hellrotem, klarem Blut. Traubenartige Bläschen hat Patientin nicht bemerkt. Viel Erbrechen.

II. Fall. 36jährige Patientin, die drei Entbindungen und drei Aborte durchgemacht hat. Menstruation mit 15 Jahren, regelmäßig, 28 : 3—4, ohne Beschwerden. Seit der Fehlgeburt im Oktober 1920 hat Patientin fast jeden Tag etwas Blutabgang gehabt. Eine eigentliche Periode hat sie nicht bemerkt. Vor 14 Tagen hatte sie eine

zwei Stunden lange, starke Blutung und starke Schmerzen im Unterleib gehabt. Dann zweimal ein großes Gewächs abgegangen, das aus lauter Bläschen bestand; am nächsten Tage sei nochmals ein Abgang eines kleinen Stückchens bemerkt worden. Seitdem wieder fast täglich geringer Blutabgang.

III. Fall. 29jährige Patientin, die eine Entbindung durchgemacht hat. Keine Aborte. Menstruation mit 17 $\frac{1}{2}$ Jahren, 28 : 3, nie stärkere Schmerzen. Letzte Regel Mitte Juli, einmal etwa Anfang September geblutet. Ab August fühlte sich Patientin schwanger, hatte täglich Erbrechen, bemerkte, daß der Leib schnell stärker wurde, hatte beim Husten Schmerzen in der rechten Leiste. Anfang September kleine Blutung, schwächer als bei der Periode. Etwa am 27. September starke Blutung, anscheinend aus einem geplatzten Scheidenvarix, die von einem Arzte durch Umstechung gestillt wurde. In den letzten vier Wochen ging ständig etwas Wasser und Blut ab. Zweimal bemerkte Patientin auch Klumpen, die, wie sie sich ausdrückt, wie ein „Nierchen“ ausfahen. Patientin muß ständig infolge der Schwäche das Bett hüten. Seit Anfang Sept. häufig Oppressionsgefühl, Lufthunger beim tiefen Liegen. Meist fühlt sich Pat. ziemlich elend. Jeden Tag Erbrechen. Am 24. Oktober stellen sich um die Mittagszeit plötzlich sehr heftige Schmerzen im Unterleib ein; es kamen dabei dicke Blutklumpen und blasige Stücke heraus. Danach heftige Blutung, weswegen Patientin in die Klinik eingewiesen wurde.

Neben den oben erwähnten Symptomen wäre dann, wie wir aus den drei angeführten Fällen ersehen, noch in Betracht zu ziehen der stets stark übelriechende Ausfluß und das Initialsymptom einer Schwangerschaft, das Erbrechen.

Diagnose. Die Diagnose der Blasenmole ist in den meisten Fällen mit einiger Sicherheit zu stellen. In vielen Fällen bringt ja schon die Anamnese das Hauptdiagnostikum, nämlich den teilweisen Molenabgang. Die abnorme Ausdehnung des Uterus, im Verhältnis zur Zeit des Ausbleibens der Regel, keine hörbaren Herztöne, Fehlen aller Kindsteile und die Weichheit des Uterus, ohne daß sich eine eigentliche Fluktuation nachweisen läßt, sind recht charakteristische Befunde. So kann im 3. Monat der Schwangerschaft der Fundus uteri bereits bis handbreit oberhalb des Nabels reichen. Der Uterus bei Blasenmole wird zuweilen als verkleinert bezeichnet. Diese scheinbaren Widersprüche erklären sich so, daß die Blasenmole natürlich ein größeres Volumen hat als die normale Plazenta; ihr Wachstum ist aber beschränkt, weil sie abstirbt, und zwar sehr oft vor Ablauf der ersten Hälfte der Schwangerschaft; es fehlt außer-

dem das Fruchtwasser, und es bleibt vom 5. Monat ab der Uterus im Vergleich zur normalen Schwangerschaft klein.

Daraus sehen wir, daß bei „vergrößert“ bzw. „verkleinert“ immer berücksichtigt werden muß, ob die Untersuchung in der ersten oder in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft stattgefunden hat.

Besteht also bei solchen Verhältnissen ein blutig-feröser Ausfluß, treten endlich wiederholte Blutungen ein, so ist die Diagnose äußerst wahrscheinlich.

Das Vorhandensein von Ödemen und ein eiweißhaltiger Urin stärken die Diagnose.

Sicher wird sie durch den Nachweis einzelner Bläschen, die zuweilen dem ergossenen Blute beigemischt sind.

Beginnt der Abort, so fühlt der Finger im Muttermund statt einer Blase weiche, schwammige Massen und Blutkoagula.

Gelegentlich einer Sitzung der Gesellschaft für Gynäkologie sagte Veit bei der Diskussion, für ihn seien drei Punkte Hinweis auf die Diagnose Blasenmole:

- I. Das Vorhandensein eines Gewebstückes, das in die Uterushöhle hervorragte, nachdem wenige Wochen vorher die Finger die Uterushöhle leer gefunden hatte. Das ist nur durch das Hineingelangen von Zotten in die Venen und deren Ausstoßung in die Höhle zu erklären.
- II. Die Albuminurie, deren Auftreten bei Blutungen von Schwangeren ich als beweisend für Blasenmole anzusehen geneigt bin.
- III. Die Frage der diagnostischen Auskratzung.

Punkt 2 der Veit'schen Diskussion veranlaßte mich, nicht nur die Albuminurie, sondern überhaupt den ganzen Urinbefund zur Darstellung zu bringen. Von den 28 Patientinnen mit Blasenmole hatten:

Eiweiß	. . .	10 Pat.	= 35,7%, daneben bzw. gesondert
Sediment	. . .	2 Pat.	= 7,1%
Erythrozyten	. . .	5 Pat.	= 17,85%
Leukozyten	. . .	7 Pat.	= 25%
Epithelien	. . .	7 Pat.	= 25%
Zylinder	. . .	3 Pat.	= 10,7%

Nicht zu unterschätzen wäre weiterhin die reichliche Absonderung von Brustdrüsensekret bei Blasenmole, eine Erscheinung, der bisher wenig Beachtung geschenkt worden ist.

Leider ist auch hier aus vielen, vor allen Dingen älteren Krankengeschichten nicht zu ersehen, ob daraufhin untersucht worden ist. Immerhin zeigen aber von 8 auf Colostrum untersuchte Patientinnen 7 einen positiven und nur eine einen negativen Befund.

Einen weiteren diagnostischen Punkt will O. H. Kleine in der Milchsäureanhäufung in der Blasenmolenflüssigkeit sehen. Denn den intensiv arbeitenden Chorionepithelien dient als Energiequelle die Umwandlung eines Teiles des im mütterlichen Blute dargebotenen Zuckers in Milchsäure. Die Drosselung der mütterlichen arteriellen Zufluß- und venösen Abflußbahnen des intervillösen Raumes bei Blasenmolen führt zu einem Sauerstoffmangel, der eine vermehrte Milchsäurebildung zur Folge hat, analog der von Löfer im Warburg'schen Versuch festgestellten Tatsachen, daß Plazenta (vor allem jugendliche Plazenta) unter anäroben Bedingungen mehr Milchsäure bildet, als unter äroben. Das Fehlen des regulären Zottengefäß- und Nabelschnurgefäßsystems, wie es für die klassische Blasenmole typisch ist, verzögert den Abtransport der Milchsäure. Dadurch kommt es zu einer Milchsäureanhäufung in der Blasenmolenflüssigkeit.

Last not least komme ich nun zur Diagnosestellung mittels der Aschheim-Zondek-Reaktion.

Bei Blasenmole ist die Hypophysenvorderlappenhormonproduktion ganz erheblich gesteigert. Werte bis zu 200 000 und mehr M.E. pro Liter Harn konnte in Übereinstimmung mit Zondek gefunden werden. Dadurch wurde die Diagnose in einzelnen Fällen erst gesichert. Daher sollte bei jeder Blutung kurze Zeit nach der Geburt, als auch bei geringstem Verdacht auf Blasenmole, die Aschheim-Zondek-Reaktion durchgeführt werden. Auch sollte man sich mit der Ausschabung allein nie begnügen, sondern in jedem Falle die viel feinere A.Z.R. anstellen.

Aus diesen Erwägungen heraus erklärt es sich, daß die meisten Gynäkologen nicht nur mit der Ausschabung eine A.Z.R. anstellen, sondern wegen der Gefahr des Auftretens eines Chorionepithelioms fernerhin jede Frau mit Blasenmole prinzipiell 6 Wochen nach der Ausräumung der Blasenmole abradieren; dabei auch gleichzeitig die A.Z.R. anstellen.

Eine Abnahme des Hormonspiegels würde dann mit größtmöglicher Sicherheit gegen eine maligne Entartung (Chorionepitheliom) sprechen.

An der hiesigen Universitätsfrauenklinik ist die Aschheim-Zondek-Reaktion bei Blasenmole erst in den letzten Jahren angewandt worden. Bei drei Patientinnen wurde sie angesetzt, und zwar zuerst 1931 bei einer 45jährigen Frau. Sie fiel stark positiv aus. Eine Nachkürrettage mit A.Z.R. ist dagegen nicht vorgenommen worden.

Zum zweiten Male wurde sie angesetzt bei einer 27jährigen Patientin im August 1934. Sie war negativ. Nach vollständiger Ausheilung der Blasenmole wurde Pat. entlassen mit der Anweisung,

sich in 6 Wochen zwecks Nachuntersuchung vorzustellen. Sie hat den Rat befolgt und kam im September wieder. Die nach sorgfältiger Nachkürrettage vorgenommene A.Z.R. blieb weiterhin negativ.

Beim dritten Falle auch im August 1934 war sie bei einer 30jährigen Pat. stark positiv. (A.Z. Titration nach Nürnberger 1:50 und 1:100 positiv wenigstens 250 000 M.E.) Beschwerdefrei entlassen, ist sie der Aufforderung, nach 6 Wochen wiederzukommen, nicht nachgekommen.

Wie ist es nun zu erklären, daß trotz einwandfreier Blasenmole die A.Z.R. negativ sein kann, und was besagt uns die negative A.Z.R.?

Philipp schreibt darüber im Zentralblatt für Gynäkologie 1931 Nr. 8 S. 490 „Blasenmole mit negativer Schwangerschaftsreaktion“ folgendes:

„Frau von 51 Jahren, vielfach gravide gewesen, 13 Geburten durchgemacht, kam in die Poliklinik und sagt, sie sei wieder schwanger und habe aber Blutungen. Seit 1929 war die Regel etwas unregelmäßig. Daher war man in der Diagnosestellung vorsichtig.

Die Untersuchung ergab einen großen Uterus, der bis zum Nabel hin reichte. Herztöne waren nicht zu hören, von einem Fetus war nichts nachzuweisen. Gedacht wurde an eine tatsächliche Gravidität oder an ein Myom, wegen der Blutungen auch natürlich an eine Blasenmole. Daher wurde eine A.Z.R. angesetzt. *Negativ*. Die Annahme Blasenmole wurde fallengelassen. Da die Pat. aber noch weiterhin blutete, entschloß man sich zur Probekürrettage. Dabei kamen aus dem Uterus massenhaft Blasenzotteln heraus. *Indikation*: Blasenmole. Totalexstirpation des Uterus. (Verfasser läßt leider die Frage offen, weshalb er bei einwandfreier Diagnose Blasenmole — es handelt sich keineswegs um „destr. Blasenmole“ — Totalexstirpation des Uterus vorgenommen hat.) Letzterer war beim Aufschneiden noch ganz mit Blasenmolengewebe angefüllt. Nunmehr nahm ich Blasenmolengewebe, implantierte es infantilen Mäusen und bekam eine starke Reaktion an den Ovarien dieser Tiere, wie wir das von Blasenmolengewebe und von jugendlichen chorialen Gewebe junger Plazenten her kennen. Das erschien uns zunächst rätselhaft. Ich dachte, daß die Blasenmole vielleicht schon ganz gelöst im Uterus läge und nicht mehr direkt in Verbindung mit der Blutbahn stände. Aber das war nicht der Fall. Das Blasenmolengewebe ging noch überall in die Uteruswand hinein. Erst die Schnitte, die Herr Prof. *Meyer* anfertigte und mir zeigte, erklärten die Sachlage. Es zeigte sich,

daß um das Blasenmolengewebe herum ein außerordentlich stark ausgeprägter fibrinoider Wall vorhanden war, der in diesem Falle das Blasenmolengewebe von der Blutbahn abtrennt, so daß die Schwangerschaftsreaktion eben negativ ausfallen mußte, obwohl die Ovarienreaktion bei den Tieren, denen Blasenmolengewebe selbst implantiert worden war, außerordentlich deutlich war. Dieser Fall besagt natürlich nichts gegen die ausgezeichnete Schwangerschaftsreaktion von Aschheim-Zondek. Er sagt nur, daß sie negativ sein kann, wenn — was selten einmal vorkommt —, das die Reaktion auslösende Gewebe (die chorionalen Zotten) von der Blutbahn abgeschnitten ist.“

Zu diesem Falle äußerte sich Herr Zondek. Die Diskussion ging dahin, daß, wenn man unterscheiden will, ob die Zotten der Mola funktionell noch lebensfähig sind, man sie im Implantationsversuch hormonal prüfen muß. Zu diesem Zwecke legt man kleine Plazentastückchen (am besten 50—100 mg schwer) für 24 Stunden nach der von Zondek angegebenen Methode zwecks Entgiftung in Äther, um sie dann infantilen Mäusen einzupflanzen. Kann man durch die Implantation die Hypophysenvorderlappenreaktion II bzw. III auslösen, so ist damit die funktionelle Lebensfähigkeit des Zottengewebes erwiesen. Also beweist die negative A.Z.-Reaktion:

- I.) daß lebendes funktionierendes Eigewebe nicht vorhanden ist,
- II.) daß eine tote Frucht bzw. Mole vorhanden sein kann,
- III.) daß ein Kontakt der Frucht mit der mütterlichen Zirkulation nicht mehr vorhanden ist.

Therapie: Bei der Behandlung der Blasenmole muß als leitender Grundsatz gelten, baldigst nach Erkennung die spontane Ausstoßung der Mole herbeizuführen. Feste Tamponade der Cervix und Scheide mit Jodoformwatte, was aber nur bei geringer Blutung möglich ist. Gelegentlich ist auch der Metreurynter anzuwenden. Ist der Muttermund für einen Finger gut durchgängig, so beschleunigen Chinin- und Hypophysingaben die Ausstoßung. Liegt ein Teil der Mole bereits in der Scheide, so suche man durch vorsichtige Expression die Ausstoßung der gesamten Masse in zusammenhängender Form zu beschleunigen. Ein Nachtaften ist stets erforderlich. Bei vorhandenen Resten räume man mit dem Finger, sonst mit der großen stumpfen Kürette aus. Nach der Geburt der Blasenmole sorgt man durch die üblichen Mittel für gute Kontraktion des Uterus. Bei starker Blutung muß nach Hegardilatation sofort ausgeräumt werden.

An Hand von 3 Fällen will ich nun den Gang der Behandlung demonstrieren.

I. Fall.

52jährige Patientin mit Blasenmole in die Klinik eingewiesen.

Nach sorgfältiger Desinfektion der Scheide wird die Portio angehakt und dieselbe bis Hegar 16 dilatiert. Einlegen eines mit 250 ccm Lyfollösung gefüllten Metreurynters. 1 ccm Pituglandol. Nach vier Stunden traten aber noch keine Wehen auf. Darauf nochmalige Injektion von 2 ccm Pituglandol. Nach 2 Stunden traten langsam Wehen ein. Metreurynter liegt noch. Nochmals 1 ccm Pituglandol. Am anderen Tage wurde die Tamponade entfernt. Der Muttermund war eben für einen Finger durchgängig. In Sakralanästhesie wurde beiderseits die Cervix incidiert, dann Uterus digital ausgeräumt, wobei große Mengen einer Blasenmole entfernt wurden, Frucht war nicht vorhanden. Nachtaften mit großer stumpfer Kürette, Auswaschen mit Jodtinktur, Jodoformgazetampon. Nach 2 Tagen wurde der Tampon entfernt. Nach weiteren 3 Tagen stand Pat. auf. Es trat keine Blutung mehr auf. Genitalbefund war o. B. Entlassen mit der Weisung, in 6 Wochen sich wieder vorzustellen.

II. Fall. 47jährige Patientin mit Blasenmole.

24. 2. 21 Digitale Ausräumung des Uterus. Es werden reichlich Molenmassen entfernt. Nach Ausleerung zieht sich der Uterus wieder zusammen. Spülung. Es blutet nicht mehr. 2 ccm Tenosin.
25. 2. 21 Temperaturanstieg auf $39,8^{\circ}$ mit Schmerzen im linken Unterbauch. Eisbeutel.
26. 2. 21 Temp. 39° , Eisbeutel weiter, tgl. 3 mal 20 Tropfen Tenosin, abends Temp. 40° .
27. 2. 21 Temp. 37° , abends 38° , Schmerzen haben etwas nachgelassen, Eisbeutel, Tenosin.
28. 2. 21 Scheidenspülung.
 2. 3. 21 Temp. 38° , abends 39° , Patientin äußert wieder Schmerzen.
 4. 3. 21 Temp. 39° , abends 37° .
 5. 3. 21 Temp. 38° , abends 37° .
 6. 3. 21 Temp. $36,4^{\circ}$, Schmerzen haben nachgelassen. Eisblase und Tenosin weiter.
 9. 3. 21 Temp. ist in den vergangenen Tagen bis zur Norm abgefallen. Pat. fühlt sich besser. Schmerzen sind fast verschwunden. Eisblase und Tenosin werden fortgelassen.
12. 3. 21 Inn. Unterf.: Auß. Mm. klafft, inn. Mm. geschlossen, Cervikalkanal für einen Finger durchgängig, Uterus antefl., bewegl., noch etwas groß, lks. an der Cervix anschließend eine etwa fingergliedlange, daumendicke Anschwellung. Pat. erhält täglich Lichtbogen.
15. 3. 21 Lichtbogen wird nicht vertragen. Temp. abends $37,9^{\circ}$, Kopfschmerzen, Übelkeit, Lichtbogen ab.
16. 3. 21 Temp. 36° , Eisbeutel.
17. 3. 21 Prießnitz, Eisbeutel weiter.

21. 3. 21 Inn. Unterf.: Uterus von normaler Größe, sinistro-poniert-vertiert, rechts normal in Höhe des Corpus etwas unterhalb des Fundus eine kleine hühnereigroße Resistenz, schlecht beweglich, nicht druckempfindlich.
24. 3. 21 Inn. Unterf.: Trotz Aufstehens völlige Rückbildung der Resistenz, nur das linke Ovar scheint etwas groß.
25. 3. 21 Entl. und in 8 Wochen zur Probeabrafio wiederbestellt.

III. Fall.

29jährige Patientin wird nachts um 1 Uhr blutend eingeliefert. In der mitgebrachten Vorlage befinden sich große Stücke einer Blasenmole. Die Molenreste werden digital ausgeräumt. Heiße Lysof-spülung, Joddesinfektion des Uterus, Tamponade, 2 ccm Tenosin. Die innere Untersuchung nach 8 Tagen ergab:

Portio: gut zurückgebildet,

Inn. Mm.: geschlossen,

Corp. Ut.: anteflektiert, halbfauftgroß, derb.

r. Ovar: etwa hühnereigroß an der Beckenwand, beweglich.

l. Ovar: scheint auch etwas vergrößert.

Noch etwas blutvermischter Fluor.

Im Laufe von 4 Tagen hat sich Patientin gut erholt. Eisen-Arsen. Nach weiteren 8 Tagen steht sie auf. Der Entlassungsbefund zeigt aber immer noch einen ziemlich großen Uterus. Auch die beiden Ovarien sind gut tastbar. Sie kommt zur angewiesenen Nachbehandlung. Die dann angestellte Untersuchung ergibt:

Uterus: antefl., von norm. Größe und Beweglichkeit.

r. Ovar: gut tastbar, klein.

l. Ovar: tastbar, nicht mehr verändert.

Portio: glatt, noch geringe blutige Auscheidung aus dem Ut. Heiße Scheidenspülungen, Tenosin. In 6 Wochen zur eventuellen Probeauschabung wiederbestellt.

Ich glaube an Hand dieser Fälle die Wege gezeigt zu haben, die in der heutigen Therapie begangen werden, und die unter Anwendung äußerster Gewissenhaftigkeit zum Ziele, d. h. zur Rezidivfreiheit führen. Denn die Prognose ist ernst. Die Blutungen unter der Geburt sind sehr groß. Sie können zum Tode der Frau führen. Ferner ist bei dem oft protrahierten Abort und der Schwierigkeit vollständiger Ablösung der Mole die Infektionsgefahr eine große, sodaß 10%, bei schweren Fällen sogar 20% der Mütter erliegen.

Die Möglichkeit einer sich später entwickelnden Neubildung beeinflusst weiter die Prognose ungünstig, da in 6—10% der Fälle ein malignes Chorionepitheliom sich anschließt.

B.) *Destruierende Blasenmole.*

(Fall H. R. Schmidt.)

Aber bevor ich zum Chorionepitheliom, der malignen Entartung der Blasenmole übergehe, will ich kurz noch ein Zwischenglied erwähnen, das früher zum Chorionepitheliom gerechnet wurde, nämlich die „destruierende Blasenmole“. Von Franqué hat schon 1903 die strenge Unterscheidung von „destruierender Blasenmole“ und Chorionepitheliom gefordert. Man bezeichnet heute als „destruierende Blasenmole“ einige jedoch histologisch nicht als Chorionepitheliom erscheinende Fälle, in denen die Zotten die Uteruswand tief durchsetzen und sogar über diese hinaus in den Ligamenten liegen, was man auch als intraven. Heterotopie der Blasenmole bezeichnet.

H. R. Schmidt berichtet über einen in der hiesigen Klinik selbst beobachteten Fall in den „Prakt. Ergebnissen“ 1922. Seinen Ausführungen entnehme ich folgendes: 28jährige Pat. wegen Verdacht auf Extrauterin gravidität eingeliefert. 1912 ein Kind spontan geboren, letzte R. Ende Juli 1918. Seit Anfang Oktober starke Blutung, weswegen sie vom Arzte zu Hause ausgekratz worden war. Ohne Erfolg. Dauernd geringe Weiterblutung. Seit Jan. 19 blutig-eitriger Ausfluß. Kolikartige Schmerzen in der rechten Seite. Befund am 20. Febr. 19: Leib weich, Bauchdecken straff, Stuhl, Urin o. B., Portio wenig aufgelockert, Uterus kleinfautgroß, weich, beweglich. Links unten im Scheidengewölbe eine deutliche Gefäßpulsation. Rechts an den Uterus anschließend aber durch eine Längsfurche deutlich von ihm getrennt, besonders in seinem hinteren Abschnitt, eine faustgroße, glatte Geschwulst, an deren unteren Ende ebenfalls eine Gefäßpulsation sehr gut wahrzunehmen ist. Geschwulst nicht schmerzhaft. Der Verdacht auf Extrauterin gravidität bestärkt. Laparotomie. Operationsbefund: vergr. Ut., an dessen Vorderfläche eine Perforationsöffnung sichtbar ist, durch die sich schwarzblau, z. T. gelblichgrau verfärbte Massen vordrängen. An die Beckenwand heranziehende Venen scheinen mit Tumormassen gefüllt zu sein. Das Ganze macht den Eindruck eines weit vorgeschrittenen Chorionepithelioms. Exstirpation von Uterus, Adnexen und anschließenden Venenbahnen. Pat. hat den Eingriff gut überstanden. Am 16. Tag steht sie auf und verläßt geheilt am 21. Tag die Klinik, nachdem sie mit Röntgen in zwei Serien mit 2 Monaten Zwischenraum nachbehandelt worden war. Nachuntersuchung in $\frac{1}{4}$ Jahr. Wohlbefinden, objektiv nichts nachzuweisen.

Zusammenfassend handelt es sich im vorliegenden Falle um eine „destruierende Blasenmole“ im Anschluß an einen Abort mens. 3. Vor der Operation war das klinische Bild derart, daß sich der Ver-

dacht auf Extrauterin gravidität aufdrängte. Nichts wies in der Anamnese auf Blasenmole hin, vor allem hat die intelligente und gut beobachtende Frau nie Abgang heller Bläschen bemerkt. Makroskopisch sieht man, wie die Molenbläschen sich tief in die Wand eingefressen haben, hier kleine Herde bilden, scheinbar ohne im Zusammenhang miteinander zu stehen. Das Eindringen in die Muskulatur ist scheinbar sehr begünstigt worden durch die atrophische Schleimhaut. Sie ist gerade an der Stelle, wo in der Tiefe die Bläschen wuchern, sehr dünn, stellenweise nur angedeutet, es fehlt also der normalerweise bestehende dicke Wall der Dezidua. Wie schon makroskopisch, so erweist sich die Blasenmole erst recht mikroskopisch als destruierend. Die Blasen durchwuchern die Gefäße, füllen sie aus und bilden so kleine Nester in der Muskulatur. Von ganz besonderem Interesse ist der vorliegende Fall deshalb, weil man hier unmittelbar den Übergang der stark gewucherten Epithelien der Blasen in die Chorionepitheliombildung verfolgen kann. Sind in den Knoten der Uteruswand überall, wenn nicht makroskopisch, so doch immer mikroskopisch Molenbläschen mit gesundem Stroma und guter Kernfärbung zu erkennen, so fehlen sie in dem perforierten subperitonealen Knoten der Vorderwand. Hier war nichts von Molenblasen zu erkennen.

Nach den bisher veröffentlichten Fällen — es sind bis 1922 28 Fälle beschrieben worden — ist der vorliegende Fall H. R. Schmidt's der erste, bei dem „destruierende Blasenmole“ und Chorionepitheliom in unmittelbarem Übergang nebeneinander in der Uteruswand gefunden wurden.

C.) *Chorionepitheliom.*

Allgemeines.

Die Blasenmole hat neuerdings erhöhte Bedeutung gewonnen, da sie, wie ich schon oben erwähnt habe, als Ausgangspunkt für das Chorionepithelioma malignum gedeutet wird. Nicht als ob Blasenmole ein notwendiges Übergangsstadium wäre. Zwar geht vielen Chorionepitheliomen eine oder mehrere Blasenmolen voraus.

Das vermittelnde Glied ist vielmehr nur die Wucherung des Chorionepithels. Bei der gutartigen Blasenmole besteht keine selbständige Epithelwucherung ohne Zotten, beim Chorionepitheliom dagegen Epithelwucherung mit und ohne Zotten.

Eine nicht unerhebliche Übereinstimmung mit dem Chorionepitheliom hat übrigens die Blasenmole noch darin, daß die von ihr ausgehenden Zellembolien in der Lunge eine den Metastasen des Chorionepithelioms ähnliche, wenn auch nicht ohne weiteres als maligne anzusehende Proliferation zeigen, während die bei nor-

maler Plazentation mit und ohne Eklampsie vorgefundenen Embolien eine Rückbildung erfahren (*Schmorl*).

Aus all diesen Beobachtungen ergibt sich die Notwendigkeit, uns mit dem Chorionepitheliom im Zusammenhang mit der Blasenmole zu befassen.

Angaben über den Ausgang der Blasenmolen schwanken sehr stark.

<i>Krömer</i>	fand bei	7 Bl.	2	gefolgt von Chor.
<i>Pestalozza</i>	„ „	50 „	7	„ „ „
<i>König</i>	„ „	12 „	0	„ „ „
<i>L. Zeiß</i>	„ „	7 „	1	„ „ „
<i>Sunde</i>	„ „	122 „	nur 6	„ „ „
<i>U. Fr. Kl. Bonn</i>	„ „	28 „	3	„ „ „

Die Häufigkeit des Chorionepithelioms nach Blasenmole ist aber nicht ausschließlich der Fall. Nach Abort und sogar nach normalen Geburten sind Fälle von Chorionepitheliom beobachtet worden. Letzteres ist jedoch selten, wenn auch *Sunde* unter 37 eigenen Beobachtungen 8 Fälle nach normalen Geburten gefunden hat.

Auch während der Schwangerschaft wurde Chorionepitheliom gefunden (*Walthard, Gustaffson* und *Sunde*).

In einem Falle von *Gill* wurde während der Schwangerschaft mit einem fünf Monate alten Fötus und bei Plazenta ohne Blasenotten der Uterus stark durchsetzt gefunden von vielen kleinen Herden von Chorionepitheliom bis an die Serofa.

Das Chorionepithelioma maligna ist ein fötales oder richtiger gesagt plazentares Corpuscarzinom, welches durch Wucherung der vom Fötus abstammenden Zottenepithelien, der Langhansschen Zellen und des Synzytiums entsteht (*Stöckel*). Es tritt meist in Form makroskopischer Knoten von verschiedener, aber nicht sehr bedeutender Größe auf. Meist sind es kleine haselnuß- oder kirchgroße bis apfel- oder orangegroße Knoten, die zuweilen in der Einzahl, seltener in großer Zahl halb oder ganz in der Uteruswand sitzen. Die Knoten sind schwammig weich, morisch, brüchig, von blaß- oder dunkelrötlicher oder bei älteren Knoten von bräunlicher Farbe. Sie neigen leicht zu Blutungen.

Befonders bezeichnend für das Chorionepitheliom ist das blutige Aussehen der Knoten in der Uteruswand. Der Knoten ist wie gesagt weich im Gegensatz zum harmlosen Plazentarpolypen, der fast genau so aussieht, aber von harter Konsistenz ist, zuweilen infolge Verkalkung steinhart ist. Sitz ist meistens das Corpus uteri,

befonders in der Nähe des Fundus. Neben jeder anderen Stelle kann auch zuweilen die Cervix betroffen werden.

Metastasen: Aber das Chorionepitheliom bleibt nicht nur auf Uterus und Cervix beschränkt, sondern bei ihm spielen Metastasen eine große Rolle. Während andere Uterustumoren durch Übergreifen auf Blase und Mastdarm unmittelbar gefährlich werden können, tötet das Chorionepitheliom die Trägerin außer in den seltenen Fällen von Verblutung und Durchbruch in die Bauchhöhle meistens durch Metastasen und Kachexie. Die Besonderheit des Chorionepithelioms gegenüber anderen epithelialen Tumoren äußert sich in der Verschleppung auf dem Blutwege, die ja sehr nahe liegt. Daneben gibt es auch Metastasen in den Lymphknoten.

Kaum ein anderer Tumor hat so oft retrograden Transport aufzuweisen, wie das Chorionepitheliom. Scheidenmetastasen sind ungemein häufig. Der retrograde Weg in den Venen wurde hierbei zuerst von *Pestalozza* (1891) erkannt und ist später von *Pick* (1897) und vielen anderen bestätigt worden.

Wo find nun die Metastasen zu finden?

R. Meyer teilt sie ein:

I.) in nächstliegende Met.:

Uterus selber, Cervix.

II.) in örtliche Met.:

Ligamentum lat., Parametrium, Tuben, Becken, Vagina (frühzeitig varizenähnlich als blaue Knoten), Vulva, Urethra, Perineum seltener.

Durch die Spermatikalvenen und Vena cava gelangen Tumorstückchen in den großen Kreislauf.

III.) in fernliegende Met.:

Lungen, Gehirn, Leber.

IV.) in seltene Met.:

Milz, Herz, Darm, Haut, Unterhaut, Muskulatur.

Hadi (Stambul) fand sogar Metastasen in Nebennieren, Hypophyse und Thyroidea.

Nun zur Frage der präzisen Feststellung der Diagnose Chorionepitheliom.

Wichtig für die Frühdiagnose ist:

- I.) Blutungen nach einer Fehlgeburt oder ausgetragener Schwangerschaft, die durch eine Kürettage nicht zu beheben sind, sind besonders verdächtig.
- II.) Das Geschabiel besteht häufig aus Blutgerinnsel und nekrotischen Massen mit geringer Zellbeimischung.

III.) Die A.Z.R. ist ein weiteres Hilfsmittel, die gefährliche Krankheit zu erkennen.

A.Z.R.: Gerade bei der Schwierigkeit der histologischen Diagnose ist die A.Z.R. ein sehr willkommenes Hilfsmittel. Nachdem das Hormon nicht nur in der normalen Plazenta, sondern auch von *Ashheim* bei Blasenmole nachgewiesen worden war, lag es nahe, die A.Z.R. auch bei Chorionepitheliom zu erproben. Es gelang erstmalig durch Implantation von Metastasen eines Chorionepithelioms in der Niere auf infantile Mäuse zu zeigen, daß das Hormon im gewucherten Chorionepithel selber vorkommt, und zwar in sehr großen Mengen; ferner, daß bei Chorionepitheliom dauernd außerordentlich große Mengen des Hormons durch den Urin ausgeschieden werden, so daß allein aus der Massenproduktion die Diagnose des Chorionepithelioms als auch der Metastasen nach Uterusexstirpation mit Leichtigkeit gelingt.

Bevor ich zur Klinik des sekundären Chorionepithelioms — denn darum handelt es sich ja in den weitaus meisten Fällen — komme, möchte ich die Frage aufwerfen: Gibt es beim weiblichen Geschlecht ein primäres Chorionepitheliom auf teratoider Basis in entsprechender Weise wie beim männlichen?

Chorionepitheliom auf teratoider Basis:

Hans Bettinger schreibt darüber folgendes:

„7jähriges Mädchen gesunder Familie, nie krank gewesen, geistig und körperlich regelrecht entwickelt. Seit Herbst langsame Abmagerung und häufige Schmerzen im Bauch. Der hinzugezogene Arzt stellte fest:

blaß, recht schlechter E.Z., dagegen aber eine deutlich auffällige Mammaentwicklung, Herz u. Lunge o. B., rechts unten eine deutliche Resistenz, äuß. Genit. o. B. Temp. 39°, Schwierigkeit bei der Harnentleerung bei der Katheterisierung jedoch nur 30 cm Harn.

Diagnose: Perityphlitischer Abzeß!

Operation: Sie ergab einen überfaustgroßen, stielgedrehten rechtsseitigen Ovarialtumor, der ohne Schwierigkeit extirpiert wurde. Nach 14 Tagen Entlassung.

Post operationem Gewichtszunahme, blühendes, gesundes Aussehen. Die histologische Untersuchung ergab das klassische Bild eines Chorionepithelioms.

Dieser Fall zeigt uns, daß chorionepitheliale Tumoren als Bestandteile von Teratomen — z. B. Hodenteratom beim Manne — auch bei Frauen vorkommen und nicht immer in Zusammenhang mit Abort, Geschlechtsreife, Gravidität gebracht zu werden brauchen. Haben doch die *Heidrich-Fels-Mathias'schen* Untersuchungen ein-

wandfrei erwiesen, daß nicht nur das fertige Chorionepithel, sondern auch das fetale Ektoderm die Möglichkeit zu solcher Geschwulstbildung in sich trägt.

Beweisend für ein solches Vorkommen primärer Chorionepitheliome beim weiblichen Geschlecht (im zeugungsfähigen Alter ist es natürlich sehr schwer festzustellen) können aber nur die an Kindern beobachteten Fälle sein. Diese Fälle sind außerordentlich selten. Bisher sind 4 Fälle beobachtet worden.“

1. Fall *Lubarſch* 13jähriges Mädchen.
2. Fall *Pick* 9jähriges Mädchen.
3. Fall *Freund*
4. Fall Differt. von *E. Bock* 13jähriges Mädchen.

Wenn auch prinzipielle Unterschiede zwischen allen 4 Fällen nicht bestehen, so sind doch hier erstmalig hormonale Auswirkungen beobachtet worden, und es ist vom endokrinologischen Standpunkte sicher bemerkenswert, daß das wachsende Chorionepitheliom lediglich eine Mammaentwicklung, d. h. ein zu den Schwangerschaftsveränderungen gehöriges Symptom — vielleicht auf Umwege über die Hypophyse — hervorgerufen hat, nicht aber etwa Veränderungen im Sinne einer Pubertas praecox.

Durch diesen Fall ist also eindeutig erwiesen, daß auch beim weiblichen Geschlecht Chorionepitheliom auf teratoider Basis in entsprechender Weise wie beim männlichen vorkommt.

Klinik: Nun zurück zur Klinik des Chorionepithelioms unter besonderer Rücksicht auf die Therapie.

1. Fall. 47jährige Patientin mit Blasenmole wurde am
25. 3. 21 als geheilt entlassen. (Vgl. Seite 13 II. Fall)
8. 4. 21 Wiederaufnahme. Seit 2 Tagen dauernde geringe Blutung. Sonst keine Beschwerden.

I n n. U n t e r ſ.: Ut. zu groß, antefl., frei bewegl. Mm. für einen Finger durchgängig.

C. K. geschlossen.

Ov. beide etwas höckerig.

Laminaria 8 mm/6 cm eingelegt nach Dilatation bis Hegar 9.

9. 4. 21 Kürettage mit großer Kürette ergibt viel Schleimhaut. Jodtamponade. 2 ccm Tenosininjektion. Mikrosk. Unterf. der abradierten Schleimhaut ergibt eine Veränderung im Sinne des Chorionepithelioms.
10. 4. 21 Streifen entfernt, 3×15 Tropfen Tenosin.
13. 4. 21 Temp. 39,4°, Eisbeutel, weiter Tenosin.
14. 4. 21 morg. 36,1°, abends 39,2°, Allgemeinbefinden etwas gestört, aber keine Schmerzen im Unterbauch.

15. 4. 21. Heute entleert sich plötzlich etwa eine Tasse voll bräunlich gefärbte, dickliche, übelriechende Flüssigkeit.
16. 4. 21. Seit Entleerung der Flüssigkeit ist die Temp. wieder normal geworden. Allgemeinbefinden gut.
22. 4. 21. Temp. seit einer Woche normal. Pat. steht auf.
25. 4. 21. Inn. Untersf.: Ut. ziemlich tief stehend, etwa frauenfaustgroß, bewegl., sonst nichts Besonderes.
30. 4. 21. Operation: Der vergrößerte und außerordentlich weiche Ut. wird exstirpiert.
6. 5. 21. Puls und Temp. bewegen sich in vollkommen normalen Grenzen. Allgemeinbefinden gut, Wunde p. p. verheilt.
9. 4. 21. Pat. steht auf.
12. 5. 21. Inn. Untersf.: Quere Narbe fühlt sich vom Rektum aus weich an. Scheidengrund noch granuliert.
14. 5. 21. Pat. wird heute geheilt entlassen. In 4 Wochen zur Nachuntersuchung wieder bestellt.
- I. 6. 35 Pat. teilt uns auf Anfrage schriftlich mit, daß sie seit der Entlassung sich beschwerdefrei fühlt.
- II. Fall. 22jährige Patientin mit Blasenmole wurde am
11. 2. 30 als geheilt entlassen.
9. 4. 30 Wiederaufnahme. Seit 8 Tagen dauernde geringe Blutung. Fluor albus.
Inn. Untersf.: Dunkles Blut aus der Cervix. Port. glatt, Ut. retrovert. u. retroflect., läßt sich aufrichten, normal groß, Adn. u. Param. frei, Mm. geschlossen, nicht aufgelockert, Ov. nicht vergr.
10. 4. 30. Abrasio m. gr. sch. Kürette, dann m. kl. sch. Kürette. In der linken Uteruskante befindet sich eine raue Stelle, die abgekratzt wird. Die übrige Wand ist glatt. Material wird untersucht. (Path. Inst.)
11. 4. 30. A. Z. R. angesetzt.
12. 4. 30. Pat. geht es gut. Keine nennenswerte Blutung mehr.
13. 4. 30. Mikr. Befund ergibt Chorionepithelium.
14. 4. 30 Vorbereitung zur Operation. Pat. steht stundenweise auf.
16. 4. 30. Operation um einige Tage verschoben.
17. 4. 30. A. Z. R. (ante op.) stark positiv.
10 ccm Blutentnahme zur Anstellung der Oxydase-reaktion (pos. 10%).
21. 4. 30. Erneute Vorbereitung zur Operation.
23. 4. 30. Operation: Totalexstirpation. In der Wand nahe des inn. Mms. links innerhalb der Mucosa eine erbsengroße Chorionepithelgeschwulst.

26. 4. 30. Temp. leicht erhöht, Allgemeinbefinden leidlich.
27. 4. 30. Temp. und Puls normal.
29. 4. 30. Wunde p. p. verheilt.
4. 5. 30. Glatter Wundverlauf, Wohlbefinden.
8. 5. 30. Pat. steht auf.
20. 5. 30. Pat. fühlt sich weiterhin wohl.
23. 5. 30. A. Z. R. angesetzt (negativ).
24. 5. 30. Erneute Unterf.: Keine path. Resistenzen und Bestandteile nachweisbar.
30. 5. 30. Inn. Unterf.: Normaler Befund.

31. 5. 30. Beschwerdefrei entlassen. In 4—6 Wochen wiederbestellt.

I. Nachbehandlung.

17. 6. 30. Pat. fühlte sich in der Zwischenzeit beschwerdefrei.
Inn. Unterf.: o. B.
A. Z. R.: negativ.
Röntgendurchleuchtung und Aufnahme der Lunge: frei von Metastasen.

II. Nachbehandlung.

8. 7. 30. Pat. kommt zur Röntgenbestrahlung. Sie hat sich in der Zwischenzeit wohl gefühlt. Bestrahlung gut vertragen.
9. 7. 30. Entlassen, in 6 Monaten wieder bestellt.

III. Nachbehandlung.

18. 11. 30. Pat. fühlt sich wohl und völlig beschwerdefrei.
Inn. Unterf.: o. B.
Entlassen mit der Anweisung, bei den geringsten Beschwerden wiederzukommen.
17. 5. 35. Pat. teilt uns mit, daß sie sich seit der Entlassung beschwerdefrei gefühlt hat.
20. 5. 35. Pat. kommt zur Nachuntersuchung.
Inn. Unterf.: o. B., kein Anhaltspunkt für Metastasenbildung.

III. Fall. 38jährige Pat., die 3 Jahre hintereinander eine Blasenmole durchgemacht hat, fühlt sich nach der letzten (1911) nicht mehr recht wohl. Sie ist immer müde und schlapp. Von Mitte Mai bis Mitte Juli 1918 blutete sie dauernd. Da die Blutung immer stärker wurde, suchte sie den Arzt auf, der sie nach der Klinik verwies.

25. 10. 18 Aufnahme.

Inn. Unterf.: Scheide ziemlich weit, links hinter dem Introitus etwa fingergliedlang hinter dem Harnröhrenwulst eine polypöse doppelbohnen große Anschwellung. Portio klaffend.

Uterus etwas vergrößert, fühlt sich uneben an. Feste Jodoform-gazetamponade der Scheide.

27. 10. 18. Entfernen des Tampons. Abklemmen einer Zotte der Wucherung zur mikr. Untersuchung. Ätzung mit AgNO_3 -Stift, Tupfer.
28. 10. 18. Nach Entfernung des Tupfers fängt Pat. wiederum an zu bluten. In der Nacht stärker.
29. 10. 18. Auf das Geschwür ein Fischelfcher Tampon. Trotzdem Weiterbluten.
30. 10. 18. Operation: Umschneidung der blutigen Öffnung an der lk. Scheidenkante. Ein in der Tiefe sitzender etwa fingergliedgroßer Knoten wird ausgeschält. Aus den dabei eröffneten Venen quellen Geschwulstmassen hervor. Auspressen und Entfernen der betr. Venen. Wundnaht. Dann Dilatation des Ut. Sorgfältige Auschabung. Schleimhaut und reichlich faserige Gewebmassen, die aus einer Ausbuchtung über dem inn. Mm. stammen, werden gewonnen. Ausätzung und Tamponade des Ut. Nach der Operation eine physiologische Kochsalzinfusion. Dreimal täglich 15 Tr. Ergotin.
Histol. Unterf.: Chorionepithelioma uteri et vaginae.
31. 10. 18. Heftige Schmerzen in der Scheide. Urin sp. 25 Tr. e. 1% morph. Löf. Entf. des Tampons. Keine Nachbltg.
1. 11. 18. Spont. Stuhlentleerung. Sehr blaßes Aussehen. Temp. 38° . Schmerzen haben wesentlich nachgelassen. Dreimal tägl. 15 Tr. liq. ferri alb.
6. 11. 18. Stetiges Besserbefinden, noch Husten ohne Auswurf. Temp. 38° .
12. 9. 18. Temp. 37° bei gutem subj. Wohlbefinden. Scheidenwände gut verheilt. Ut. anscheinend etwas vergr. Rechts an die Cervix anschließend eine kleine nicht schmerzhaft verdickung. Portio geschlossen. Röntgenbestrahlung.
15. 11. 18. Infolge der Bestrahlung starken Brechreiz, Appetitlosigkeit, Leibschmerzen. Husten besteht weiter, Temp. 38° , Eisen-Arten-Expektorantien-Codein.
22. 11. 18. 1. Radiumeinlage. 80 mmg Rad. Rö mit $1\frac{1}{2}$ mm Messingfilter vaginal 48 Std. Rad. wird gut vertragen.
27. 11. 18. Unterf. in der med. Kl.: Keine Tbc.-Baz., keine Metastasen nachweisbar (in der Lunge). Diagnose: Bronchitis chronica.
30. 11. 18. 2. Radiumeinlage. 80 mmg Rnd. Rö. mit $1\frac{1}{2}$ mm Messingfilter vaginal 48 Std.
1. 12. 18. Entlassen. Schlechtes Aussehen. Eisen-Arten.
3. 2. 19 Wiederaufnahme. Pat. verspürte seit ihrer Entlassung

Schmerzen im Mastdarm. Blutiger Eiter — besonders stark nach warmen Aufschlägen mit essigf. Tonerde — ging fast dauernd ab.

Inn. Unters.: Nach lks. von der Urethralöffnung etwa fingerbreit von ihr entfernt fühlt man unmittelbar hinter dem Introitus vaginae eine etwa $\frac{1}{2}$ cm lange Dehiscenz der Schleimhaut, deren Ränder etwas wallartig verdickt sind. Im Spekulum sieht man in der betreffenden Stelle einen etwa fingerdicken nekrotischen Gewebssproß von typisch grauer Farbe sich vordrängen.

4. 2. 19. Zunächst Kamillen Sitzbäder. Eisen-Arten.
8. 2. 19. Beginn der Röntgenbehandlung. Es sollen im ganzen 7 Felder (vorne 3, hinten 4) je mit der Ca-Dosis bestrahlt werden
11. 2. 19. Röntgenbehandlung wird gut vertragen.
18. 2. 19. Pat. hat sich gut erholt. Seit gestern geringer Blutabgang. Befund: Geschwür hat sich gereinigt und ist etwas kleiner geworden.
20. 2. 19. Pat. fühlt sich vollkommen wohl, sieht gut aus.
21. 2. 19. Morgens fühlt sich Pat. plötzlich sehr elend, hat Schmerzen im Kreuz, Darm, Leib und zwischen den Schultern. Sie ist sehr stark verfallen und mit kaltem Schweiß bedeckt. Puls sehr beschleunigt, klein, flackerig. Objektiv ist nichts nachweisbar. Unter dauernden Kampfergaben bessert sich der Zustand allmählich. Abends verhältnismäßig gutes Befinden.
22. 2. 19. Nacht ist gut verlaufen. Die gestrige Attacke muß, da für eine Lungenembolie kein Anhaltspunkt ist, und auch für eine Blutung im Peritonealraum (eine solche wird seitens der kons. med. Kl. angenommen) nichts spricht, als eine Folge von Verschleppung von Tumorteilchen (bei der ersten Operation waren schon die Gefäßlumina mit Tumormassen gefüllt) aufgefaßt werden.
25. 2. 19. Befinden wesentlich gebessert.
1. 3. 19. Wohlbefinden.
6. 3. 19. Temperaturanstieg auf $38,8^{\circ}$ bzw. $39,6^{\circ}$. Pat. klagt über starke Schmerzen im Darm. Durchfälle ohne Beimengung. Diät.
8. 3. 19. Durchfall beseitigt.
9. 3. 19. Temp. erhöht. Starke Schmerzen auf der Lunge, besonders in der Gegend des rechten Schulterblatts. Hier hört man Rassel. Sputum heute leicht blutig. (Metastasen?) Codein-Tr.
11. 3. 19. Pat. nimmt zusehends ab. Die Beschwerden bleiben. Sputum noch immer blutig.
12. 3. 19. Lungenbefund (med. Kl.): In der Gegend des Sternums eine Dämpfung. Vorne über der Lunge mittelblasige

feuchte Rasselgeräusche und Giemen. Hinten 3 Querfinger breit parallel der Wirbelsäule eine Dämpfung, Knisterrasseln. Über beiden Lungen verschärftes In- und Expirium.

17. 3. 19. Befund derselbe. Weder Tbc. noch Tumorzellen im Sputum nachweisbar.

25. 3. 19. In den letzten Tagen von Seiten der Lunge wieder mehr Beschwerden. Ofters Schmerzanfälle auf der rechten Seite. Im Sputum nichts nachzuweisen.

3. 4. 19. Röntgendurchleuchtung (med. Kl.): Rechts neben der Wirbelsäule in der Höhe des Hilus ein kleinfaultgroßer, kompakter Schatten, von dem aus nach allen Seiten (auch nach der lk. Lunge) streifige Schatten ausgehen.

Diagnose: Tbc. pulm., evtl. mit Chorionepitheliometastasen vergesellschaftet. Im Sputum keine Tbc. oder Tumorzellen.

6. 4. 19. Deutliche Verschlechterung im Allgemeinbefinden. Starke Beschwerden von Seiten der Lunge. Reichlich blutiger Auswurf. Codein.

11. 4. 19. Ganz auffallende Verschlechterung, blutiger Auswurf, Atemnot, Verabreichung von Morphinum erforderlich.

12. 4. 19. Exitus.

Anatom. Diagnose (Path. Inst.): Malignes Chorionepitheliom des Uterus mit ausgedehnten Metastasen in den Lungen, Bronchialdrüsen, Supraklavikulardrüsen und kleine multiple Metastasen im Gehirn. Infarktähnliche Zirkulationsstörungen der Milz (Metastasen?). Chron. Tbc. der lk. Lungen spitze. Großes Ulkus des Rektums. Stauungsfettleber. Allgemeine Anämie.

Was erfahren wir aus diesen 3 Chorionepitheliomfällen?

Die beiden ersten Patientinnen bieten uns das Krankheitsbild des operablen Chorionepithelioms. Neben der üblichen Therapie war bei der ersten Pat. die Uterusexstirpation schon allein von Erfolg. Sie wurde geheilt entlassen. Zur Nachbehandlung ist sie nicht gekommen, sodaß wir uns kein Bild über die Dauerheilung machen können. Bei der folgenden Pat. fällt uns vor allem das jugendliche Alter (22 J.) auf. Das ist uns Hinweis dafür, daß nach vorangegangenen Geburten, Aborten, Blasenmolen auch in diesem Alter mit Chorionepitheliom gerechnet werden muß. Totalexstirpation und Röntgenbestrahlung brachten bei der sehr gewissenhaften Pat. — sie kam 3 mal pünktlich zur Nachbehandlung — den gewünschten Erfolg.

W. Haupt berichtet im Zentralbl. f. Gyn. 1930, Bd. 3, S. 2260 über diesen Fall. Neben dem Krankheitsverlauf entnehme ich seinen

Ausführungen folgendes: Die wenigen Fälle von Chorionepitheliom, bei welchen der Urin auf Hypophysenvorderlappenhormon untersucht worden ist, zeigen in der Mehrzahl einen positiven Befund. Es sind dies je ein Fall von *Fels*, *Goecke*, *Ehrhardt*, *Martius*, *Aschheim*, zwei Fälle von *Otto*, je drei Fälle von *Rößler - Rob. Meyer* und *Schulze-Rhondorf*. Von negativem Ausfall bei Primärtumor berichtet nur *Ehrhardt*, bei Metastase *Goecke*. Verfasser kann der Zahl der positiven Befunde durch vorliegenden Fall einen weiteren hinzufügen. Will man das Ergebnis der A. Z. R. für die Prognose verwerten, so könnte man auf Grund der 4 günstig verlaufenen Fälle von *Rößler* und *Schulze-Rhondorf* mit ebenfalls erst positiven, post operationem negativen Verhalten der A. Z. R. eine völlige Heilung als wahrscheinlich annehmen, wenn auch hervorgehoben werden muß, daß in den angeführten Fällen die Nachbehandlung sich nur über wenige Monate erstreckte. Neben dem positiven Befund gewinnt aber der Fall dadurch noch an Bedeutung, daß die Annahme einer völligen Heilung noch erhärtet werden kann durch die 5jährige Rezidivfreiheit unserer Pat. (Vgl. Tab. S. 29), wie die am 20. 5. 35 stattgehabte Untersuchung (vgl. S. 22) ergeben hatte. Zur Vorsicht mahnt aber die Beobachtung von *Goecke*. Trotz stark positiver Reaktion bei Vorhandensein des Primärtumors fiel späterhin nach postoperativen Auftreten einer Scheidenmetastase die Reaktion negativ aus. Mit dieser Beobachtung wird die vom Verfasser in unserem Fall vorgenommene prophylaktische Röntgenbestrahlung begründet.

Der dritte Fall gibt uns den traurigen Krankheitsverlauf eines inoperalen Chorionepithelioms wieder. Wir sehen die retrograde Metastasierung in der Vagina und in den mit Tumormassen prallgefüllten Gefäßlumina. Ausschabung des Vaginalknotens, Auspressen und Entfernen der betreffenden Venen, vermögen in Kombination mit Röntgen-Radium die Krankheit nicht zu kupieren. Schleichend ohne objektiven Befund — im Sputum weder Tbc. noch Tumorzellen — wird bei subjektiven Beschwerden die Lunge befallen. Erst ein Monat ante mortem deutet ein blutiges Sputum — im Sputum aber noch immer nichts nachzuweisen — auf eine Lungenmetastase hin. Trotz Anwendung der zur Verfügung stehenden Mittel kommt Pat. dann einen Monat später ad exitum. Die vorgenommene Sektion hat dann nicht nur die Vermutung der Metastase bestätigt, sondern vielmehr gezeigt, daß ohne objektiven Befund neben den fernliegenden Metastasen in Lungen, Bronchialdrüsen, Gehirn noch die seltene Metastase in der Milz vorhanden war (vgl. S. 18).

Es sei nun noch kurz auf die allgemeinen Heilungsaussichten

hingewiesen. In der Literatur ist in zahlreichen Mitteilungen bisher, wie *Hitschmann* festgestellt hat, über rund 1000 Fälle von Chorion-epithelioma malignum berichtet worden. Größere Statistiken gibt es kaum, die uns ein Urteil darüber erlauben würden, wie die Heilungsaussichten dieser Erkrankung sind. Je nach dem Vorwiegen der operablen und inoperablen Fälle sind auch die angegebenen prozentualen Ausrechnungen sehr variabel. Die operative Dauerheilung ist geschätzt worden

von Harstlin	auf 65 %
von Polano	auf 50 %
von Polosson	auf 73 %
von Teatscher	auf 66 %

Berechnet ist die absolute Heilung von *Sunde* aus 38 Fällen, von denen 12 geheilt sind, auf 32 %. Von diesen 38 Fällen waren jedoch 20 inoperabel.

Über die Strahlenbehandlung des Chorionepithelioma malignum schreibt *H. Wintz* in den Berichten über Gyn. u. Gebh. 1933 Bd. 23 S. 361 folgendes: Die Mehrzahl der Autoren ist geneigt bei der Erkrankung des Chorionepithelioms operativ vorzugehen, obwohl in der Operation die Gefahr einer Provokation von Metastasen verborgen ist. Indessen sind die Zellen des Chorionepithelioms höchst radiumempfindlich. Der Erfolg der Strahlentherapie hängt jedoch nicht von diesem Faktor, sondern auch vom Zustande der Abwehrkräfte und von dem Mangel oder Vorhandensein von Metastasen ab. Im Laufe der letzten 15 Jahre wird vom Verfasser die Strahlentherapie in jedem Falle des Chorionepithelioms angewandt. Es wurden vom Autor 10 Fälle dieser Erkrankung beobachtet, wobei 7 Pat. noch gegenwärtig am Leben sind. Die der Behandlung nachfolgende Beobachtungsdauer betrug 2—13 Jahre. Unter den Todesfällen fand der Exitus in einem Falle infolge des Grundleidens, des Chorionepithelioms, statt. Die zweite Kranke exitierte infolge der Darmundurchgängigkeit und die dritte — 9 Jahre nach stattgehabter Behandlung — an einer zufälligen Erkrankung. Da der zweite Fall nicht ganz klar war, nimmt Verfasser an, daß ein absolut positives Resultat von der Strahlenbehandlung in 8 aus der Gesamtzahl von 10 Fällen erreicht worden ist. Die Dosis schwankt bei der vom Verfasser angewandten Methode von 80 bis 90 % H.E.D. Nur in zwei Fällen wurde die nachfolgende Radiumtherapie angewandt, die vom Verfasser überhaupt nicht empfohlen wird. Am Anfang ging der Verfasser im allgemeinen in der bei der Behandlung des Uterus-Ca üblichen technischen Weise vor. Später wurde die konzentrierte (einmalige) Bestrahlung von einer großen Distanz angewandt. Der Meinung des Verfassers nach ist der Erfolg

der Röntgenstrahlen mit der Fähigkeit des Mutterblutes, die Geschwulstkeimzellen zu vernichten, verbunden. Da die Röntgentherapie bei Chorionepitheliom ganz gefahrlos ist, und keine Dissemination der Geschwulst hervorruft, muß die Strahlenbehandlung des Chorionepithelioms einen besseren Erfolg zeigen als die Operation.

Aus der Behandlung des Chorionepithelioms muß man den Schluß ziehen, daß bei operablen Fällen die operative Behandlung mit anschließender Bestrahlung des ganzen Beckens und eventueller vorhandener Metastasen die beste Behandlung darstellt, wobei es sich gezeigt hat, daß die Röntgenstrahlen wegen ihrer größeren Reichweite vor der Radiumbehandlung den Vorzug verdienen, insbesondere bei erfolgter Metastasierung.

D. Therapieerfolg an der hiesigen Klinik.

I. bei Blasenmole: Wir haben an 18 Pat. Anfragen gerichtet, die uns über ihr Befinden post operationem Auskunft geben sollten. Unserer Bitte sind 11 Pat. nachgekommen. Aus allen Berichten geht zu unserer besonderen Freude hervor, daß sich ausnahmslos alle Pat. seit ihrer Entlassung beschwerdefrei gefühlt haben. Wie alt unsere Pat. geworden und wieviel Jahre sie rezidivfrei geblieben sind, soll folgende Tabelle zeigen.

	Name	Behandlg.	jetziges Alter	rezidivfrei seit:
1.	Fr. Marg. P.	1913	53 J.	22 J.
2.	Fr. Maria L.	1916	55 J.	19 J.
3.	Fr. Anna M.	1916	68 J.	19 J.
4.	Fr. Sus. B.	1917	48 J.	18 J.
5.	Fr. Kath. B.	1919	46 J.	16 J.
6.	Fr. Christ. P.	1922	42 J.	13 J.
7.	Fr. Mecht. M.	1923	40 J.	12 J.
8.	Fr. Elis. T.	1927	55 J.	8 J.
9.	— T.	1931	49 J.	4 J.
10.	Fr. Ant. K.	1932	23 J.	3 J.
11.	Fr. Kath. A.	1934	28 J.	1 J.

Mag die Prognose bei Blasenmole auch noch so ernst sein (vgl. S. 14), so können wir in Bezug auf das verhältnismäßig hohe Alter, das ein Teil unserer Patientinnen erreicht hat, und in Bezug auf die lange Dauer der Rezidivfreiheit von einem vollen Therapieerfolg sprechen. Diese Tatsache wird dadurch noch erhärtet, daß eine Pat. 2 Jahre nach der Ausschabung einem gefunden, kräftigen Mädchen das Leben geschenkt hat, eine Beobachtung, die ja nach Sunde nicht selten vorkommen soll (vgl. S. 7). Eine andere Pat. ist zur

Zeit schwanger (mens VI). Da sie aber über die für die Ausstoßung der Mole bevorzugten Monate hinaus ist (vgl. Tab. S. 7), so steht zu hoffen, daß auch sie ihre Frucht austragen wird.

II. Bei Chorionepitheliom: Beide Patientinnen (die 3. Pat. kam ja während der Behandlung ad exitum wegen Meta-stasenbildung) fühlen sich auch seit ihrer Entlassung beschwerdefrei.

	Name	Behandlg.	jetziges Alter	rezidivfrei seit:
1.	Fr. Helene H.	1921	61 J.	14 J.
2.	Fr. Kath. Sch.	1930	27 J.	5 J.

Durch Operation und Röntgenbestrahlung (vgl. I. Fall S. 20 und II. Fall S. 21) wurde bei beiden Patientinnen eine Dauerheilung erzielt. Das ist uns also Beweis dafür, daß bei operablen Fällen die operative Behandlung mit anschließender Bestrahlung des ganzen Beckens die beste Behandlung darstellt, die eine Dauerheilung verspricht.

ZUSAMMENFASSUNG.

Von 1912—1934 sind bei 23 116 Geburten 28 Blasenmolen (= 0,12%) und darunter wieder 3 Chorionepitheliome (= 10,7%) beobachtet worden. Wir sehen also, daß im Verhältnis zu den Geburten das Chorionepitheliom äußerst selten vorkommt, dagegen zur Blasenmole eine verhältnismäßig hohe Prozentzahl herauskommt, eine Zahl, die mit den in der Literatur angeführten übereinstimmt.

Bei der statistischen Betrachtung der Blasenmole und des Chorionepithelioms konnte ich folgendes herausstellen:

A. Blasenmole.

Die Blasenmole befiel Frauen jeden Alters, jedoch bei Bevorzugung des 3. Jahrzehnts.

Die Wiederholung der Blasenmole bei ein und derselben Frau ist nicht häufig. Bei 2 Patientinnen konnte eine dreimalige Wiederholung beobachtet werden.

Nicht selten folgen auf Blasenmolen später normale Geburten. So konnte uns eine Pat. mitteilen, daß sie 2 Jahre post operationem ein gesundes, kräftiges Kind geboren hat.

Die Ausstoßung erfolgte im 3.—5. Monat, wobei im 4. Monat der Höhepunkt lag.

Neben den klassischen Symptomen hatten wir einen stets übelriechenden Ausfluß und das Initialsymptom einer Schwangerschaft, das Erbrechen festgestellt.

Was die Diagnose anging, so fanden wir bei 10 Pat. Ödeme und Albuminurie (= 35,7%); ferner zeigten von 8 auf Colostrum untersuchte Pat. 7 einen positiven, nur eine einen negativen Befund.

Bei 3 Pat. wurde die A. Z. R. angesetzt. Sie war bei zweien stark positiv, bei einer negativ.

Therapeutisch wurde nach Möglichkeit die Spontanausstoßung abgewartet, wenn nicht, so führte nach sorgfältiger Desinfektion der Scheide und nach Dilatation der Cervix die digitale Ausräumung mit Nachkürettage mit gr. ft. Kürette zum Ziel.

B. Destruierende Blasenmole.

Als destruierende Blasenmole bezeichnet man einige Fälle, in denen die Zotten die Uteruswand tief durchsetzen und sogar über diese hinaus in den Ligamenten liegen, was man auch als intravenöse Heterotopie der Blasenmole bezeichnet, also eine Blasenmole, die organoidisch maligne, dagegen histologisch benigne ist. *H. R. Schmidt* berichtete über einen solchen Fall aus hiesiger Klinik (1922). Darüber hinaus gewann der Fall noch an Bedeutung, weil hier zum ersten Male Blasenmole und Chorionepitheliom in unmittelbarem Übergang nebeneinander in der Uteruswand gefunden wurden.

C. Chorionepitheliom.

Die Blasenmole wird neuerdings als Ausgangspunkt für das Chorionepitheliom malignum gedeutet. Es braucht aber nicht ausschließlich der Fall zu sein. Fälle von Chorionepitheliom sind nach Aborten und sogar nach normalen Geburten beobachtet worden. Besonders bezeichnend für das Chorionepitheliom sind.

1. die leichte Neigung zu Metastasenbildung,
2. die Bevorzugung des retrograden Weges und
3. die Verschleppung der Tumorteilchen auf hämatogenem Wege.

Gerade bei der Schwierigkeit der histologischen Untersuchung ist die A. Z. R. ein willkommenes Hilfsmittel. Sie liefert dauernd außerordentlich große Mengen des Hormons, sodaß allein aus der quantitativen Hormonausscheidung die Diagnose, als auch die Metastasenbildung nach Uterusexstirpation mit Leichtigkeit gelingen.

Wir fanden von 28 Blasenmoln 3 gefolgt von Chorionepitheliom (10,7%). 2 Fälle waren operabel; der 3. inoperabel. Die beiden operablen Fälle kamen durch Uterusexstirpation bzw. kombiniert mit Röntgenbestrahlung geheilt zur Entlassung, während die 3. Pat. trotz Röntgen-Radium wegen Metastasen ad exitum kam.

D. Therapieerfolg an der hiesigen Klinik.

Aus allen uns zugefandten Berichten geht eindeutig hervor, daß sich alle Patientinnen seit ihrer Entlassung beschwerdefrei gefühlt haben. Berücksichtigen wir nun das hohe Alter und die lange Dauer der Rezidivfreiheit des weitaus größten Teiles unserer Pat., so können wir von einem vollen Therapieerfolg sprechen.

Zum Schlusse ist es mir eine angenehmen Pflicht, dem Herrn Prof. Dr. Haupt, dem jetzigen Direktor der Univ.-Frauenklinik Jena, für die Überlassung der Arbeit, dem Herrn Prof. Dr. Siebke für die Übernahme der Arbeit und des Korreferates und last not least dem Herrn Doz. Dr. Rupp für die Übernahme des Referates meinen besten Dank auszusprechen.

Literaturangabe.

- Bettinger, H.: Beiträge zur Lehre vom Chorionepitheliom. (Aus dem Path. Institut Breslau).
- Franqué, O. v.: Zur destruierenden Blasenmole (Verhandlung der deutschen Gesellschaft f. Gyn. 1903 Würzburg).
- Über malignes Chorionepitheliom (Fränk. Gef. f. Gyn. u. Gebh. 31. Jan. 1903, Ref. M. m. W. 1903 Nr. 12).
- Demonstration eines Chorionepithelima malignum (Mittelrhein. Gef. f. Gebh. u. Gyn. 13. März 1909).
- Haupt, W.: Chorionepitheliom u. A.Z.'sche Reaktion (Zentr. f. Gyn. 1930 Bd. 3, S. 2260).
- Hinfelmann, H.: Ätiologie, Symptomatologie u. Diagnostik des Chorionepithelioms (Stöckel 6 I).
- Jaschke, v. P.: Lehrbuch der Geburtshilfe (Erkrankungen des Chorions).
- Kleine, H. O.: Milchsäureanhäufung in Blasenmolenflüssigkeit (Zentr. f. Gyn. 1933 Nr. 27).
- Marchand: Über den Bau der Blasenmole (Zeitschr. f. Gyn. u. Gebh. Bd. 32).
- Meyer, Rob.: Die Pathologie der Mola hydatiformis u. des Chorionepithelioma malignum uteri (Stöckel 6 I).
- Metastasen des Chorionepithelioma malignum (Stöckel 6 I).
- Biologische Diagnose des Chorionepithelioma malignum (Stöckel 6 I).
- Philipp: Blasenmole mit negativer Schwangerschaftsreaktion (Zentralblatt f. Gyn. 1931 Nr. 8, S. 490 ff.).
- Schmidt, H. R.: Über gutartige und bösartige destruierende Blasenmole (Prakt. Ergebnisse 1922).
- Stöckel, W.: Lehrbuch der Gynäkologie (Chorionepithelioma uteri).
- Winter, E. W.: Zur Klinik der Blasenmole und des Chorionepithelioms (Zentralbl. f. Gyn. 1934 Nr. 31).
- Wintz, H.: Die Strahlenbehandlung des Chorionepithelioma malignum (Berichte über Gyn. u. Gebh. 1933 Bd. 23 S. 361).

Lebenslauf.

Als Sohn des Reichsbahnoberkassenverwalters Lorenz Delord und seiner Frau Antonie, geb. Harbaum, wurde ich, Willy Delord, am 7. Mai 1909 zu Sinzig a. Rh. geboren. Nach vierjährigem Besuch der Volksschule in Linnich (Rhld.) kam ich 1919 auf das Gymnasium zu Jülich. Nachdem ich das Examen für die Obersekundareife bestanden hatte, besuchte ich das Realgymnasium zu Düren, wo ich Ostern 1931 die Reifeprüfung bestand. Anschließend nahm ich sofort das Studium der Medizin auf. Ich besuchte während der Dauer des Studiums sechs Semester lang die Universität Würzburg, wo ich im Winter-Sem. 33/34 meine ärztliche Vorprüfung ablegte. Die restlichen fünf Semester studierte ich in Bonn, woselbst ich im Winter-Sem. 36/37 das ärztliche Staatsexamen bestand.
